Chasselas blanc 56 A.F.

Vass2R11s346-350

FINA Collection Vassal-Montpellier

2 Respective Ax Re

6-228

FH

Charselos II 56 AF
2R11-350







Formulaire de description 2/8

(floraison)

Année

2001

Code introduction

Code cépage

Nom introduction: Af de charoclas 56

Observateur: TD

Emplacement: 2 RM & 346 _ 350

Bourgeonnement

oiv 001 forme: globuleuse 3 - demi-ouverte 5 - ouverte (7)

oiv 002 distribution pigmentation anthocyanique : absente V- en liseré 2 - partout 3

oiv 003 intensité pigmentation anthocyanique : nulle ou très faible T- faible 3 - moyenne 5 -

forte 7 - très forte 9

oiv 004 densité poils couchés : nulle ou très faible Î - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. oiv 005 densité poils dressés : nulle ou très faible ① - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

Jeunes feuilles

oiv 051 couleur face supérieure (4° feuille détachée) : verte 1 - jaune 2 - plages bronzées 3 -

cuivrées rougeâtre sur toute la surface (4)

oiv 053 densité poils couchés entre nervures (face inf. 4° feuille) : nulle ou très faible Ø- faible 3 -

moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 054 densité poils dressés entre nervures (face inf. 4° feuille) : nulle ou très faible ? - faible 3 moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 055 densité poils couchés sur nervures (face inf. 4° feuille) : nulle ou très faible D- faible 3 moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 056 densité poils dressés sur nervures (face inf. 4° feuille) : nulle ou très faible 0 - faible 3 moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

Vassal:

Jeunes feuilles du haut (3 premières détachées)

Profil: étalées 1 - en gouttière 2 - autre 3

Densité poils dressés face inf. : nulle ou très faible 280 - moyenne 200 - très forte 201

Densité poils couchés face inf. : nulle ou très faible 299 - faible 202 - moyenne 203 - très forte 204 Densité poils dressés face sup. : nulle ou très faible (1) - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

Densité poils couchés face sup. : nulle ou très faible (1)- faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9 Couleur face sup. : blanc 205 - fauve roux 206 - carminé 207 - liseré carminé 208 - jaune 209 -

plages bronzées ou cuivrées 210 - vertes 212 - autre 213

(Dans le cas où la 1° feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° feuille détachée sera notée :)

Jeunes feuilles du bas (3 suivantes)

Profil: plan 1)- en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

Densité poils dressés face inf. : nulle ou très faible 284 - moyenne 215 - très forte 216.

Densité poils couchés face inf. : nulle ou très faible 283 - faible 223 - moyenne 224 - très forte 225. Densité poils dressés nervures face inf. : nulle ou très faible 282 - moyenne 215 - très forte 216.

Densité poils couchés nervures face inf. : nulle ou très faible 283 - faible 217 - moyenne 218 -

très forte 219.

Densité poils dressés face sup. : nulle ou très faible 0 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9 Densité poils couchés face sup. : nulle ou très faible 0- faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9 Couleur face sup. : blanc 226 - fauve roux 227 - carminé 228 - liseré carminé 229 - jaune 230 plages bronzées ou cuivrées (23) - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - vertes 233

Formulaire de description 3/8 (floraison)

2as1 Année :

Code introduction:

Observateur: TD

Code cépage :

Nom introduction: AFde chareles 56

Rameau herbacé

oiv 006 port : érigé 1 - demi-érigé 3 - horizontal 5 demi-retombant 7 - retombant 9 oiv 351 vigueur rameaux : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5- forte 7 - très forte 9.

oiv 007 couleur face dorsale entrenoeuds : verte P- verte à raies rouges 2 - rouge 3

oiv 008 couleur face ventrale entrenoeuds : verte b- verte à raies rouges 2 - rouge 3

oiv 009 couleur face dorsale noeuds : verte D - verte à raies rouges 2 - rouge 3

oiv 010 couleur face ventrale noeuds : verte 0 - verte à raies rouges 2 - rouge 3.

oiv 011 densité poils dressés noeuds : absence (1)- présence 9.

oiv 012 densité poils dressés entrenoeuds : absence P - présence 9.

oiv 013 densité poils couchés noeuds : nulle ou très faible D- moyenne 5 - forte 9.

oiv 014 densité poils couchés entrenoeuds : nulle ou très faible (b - moyenne 5 - forte 9.

oiv 015 pigmentation anthocyanique écailles des bourgeons : nulle ou très faible 1 - faible 3 moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 016 distribution vrilles: discontinue (2 ou moins) P- subcontinue ou continue (3 ou plus) 2. oiv 017 longueur vrilles: très courtes (<10cm) 1 - courtes (15cm) 3 - moyennes (20cm) 5 - longues (25cm) (2 très longues (>30cm) 9.

Inflorescence

oiv 151 sexe de la fleur : mâle 1 - mâle à hermaphrodite 2 - hermaphrodite 3 - femelle à étamines érigées 4 - femelle à étamines reflexes 5.

oiv 152 niveau insertion 1° inflorescence : jusqu'au 4° noeud D- au-delà du 4° noeud 2

oiv 153 nombre inflorescence/rameau: 1 ou moins (1)-1,1 à deux 2 - 2,2 à trois 3 - plus de trois 4. oiv 155 inflorescence sur rameaux issus des 3 yeux de la base : absence 1 - présence 9.

oiv 501 taux de nouaison (7 à 14 j après floraison) : très faible (<10%) 1 - faible (11-30%) 3 moyen (31-50%) 5 - élevé (51-70%) 7 - très élevé (>80%) 9.

Vassal

Surface du rameau herbacé : unie 1 - côtelée 2

000-10 Villosité spéciale du rameau herbacé : épines ou analogues I - poils massifs 29- monte (5)

000-21 Couleur des vrilles : jaune n-rouge clair 2 - rouge foncé 3 - vert 4

Bouton floral: petit 1 - moyen 2 - gros 3.

Formulaire de description 4/8

(entre nouaison et véraison)

Année

2001

Code introduction:

Observateur

Code cépage Nom introduction: AFde Chasselas 56

Emplacement: 2 RMA346-350

Feuille adulte

oiv 065 taille : très petite 1 - petite 3 moyenne 5 - grande 7 - très grande 9

oiv 067 forme du limbe : cordiforme 1 - cunéiforme 2 - pentagonale 3 - orbiculaire 4 - réniforme 5

oiv 068 nombre de lobes : feuille entière 1 - trois 2 - einq 35 - sept 4 - plus de sept 5.

oiv 069 couleur face supérieure limbe : vert clair 3 - vert moyen 5 - vert foncé 7

oiv 070 pigmentation anthocyanique des nervures, face supérieure : nulle 1 - point pétiolaire

rouge prouge jusque première bifurcation 3 - rouge après première bifurcation 4.

oiv 071 pigmentation anthocyanique nervures, face inférieure : nulle 1 - point pétiolaire rouge 2 - rouge jusque première bifurcation 3 rouge après première bifurcation 4.

oiv 074 profil: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté @- tourmenté 5

oiv 073 ondulation limbe (entre nervures I ou II) : absente 1 - présente 9.

oiv 072 gaufrure limbe (dépressions entre nervures II ou III) : absent P- présente 9

oiv 075 cloqure face supérieure limbe (relief entre nervures de dernier ordre) nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7- très forte 9.

oiv 084 densité poils couchés entre nervures face inférieure ;

nulle ou très faible D- faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9

oiv 085 densité poils dressés entre nervures face inférieure :

nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9

oiv 086 densité poils couchés des nervures face inférieure

nulle ou très faible 1) - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9

oiv 087 densité poils dressés des nervures face inférieure :

nulle ou très faible 4 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 088 villosité conchée des nervures principales face supérieure : absente D- présente 9 oiv 089 villosité dressée des nervures principales face supérieure : absente 1)- présente 9.

Pétiole

oiv 090 densité poils couchés : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 forte 7 - très forte 9 oiv 091 densité poils dressés : nulle ou très faible ? - faible 3 - moyenne 5 forte 7 - très forte 9.

oiv 093 longueur du pétiole p/r nervure médiane

beaucoup plus court 1 - plus court 3 - égal 5 - plus long 7 - beaucoup plus long 9 | sinus pétiolaire ouverture = 1 13-4-5-6 / forme = U-accol. 0 / dent = oui-non / dégarni parfors-oni]

oiv 501 taux de nouaison (7 à 14 j après floraison) : très faible (<10%) 1 - faible (11-30%) 3 moyen (31-50%) 5 - élevé (51-70%) 7 - très élevé (>80%) 9

Vassal:

Densité poils couchés limbe face supérieure :

nulle ou très faible / - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9

Densité poils dressés limbe face supérieure :

nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9 oiv 000-06 Couleur du pétiole: vert 3- partiellement coloré 2 - coloré 1

Formulaire de description 6/8 (après chute des feuilles)

Année:

2001

Code introduction:

Observateur: TD

Code cépage : Nom introduction: Af de charselas 56

Emplacement: 2 Ru san6.350

Sarment

oiv 101 section transversale : circulaire 1 - elliptique 3- aplatie 5.

oiv 102 surface : unie 1 - côtelée 2 - striée 3

oiv 103 couleur générale : jaune 1 - brunâtre 2 - rouge violacé 3 - gris 4

oiv 104 lenticelles : absentes V - présentes 9.

oiv 105 densité des poils dressés des nœuds : absence V- présence 9.

oiv 106 densité des poils dressés des entrenœuds : absence y - présence 9.

oiv 351 vigueur : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 352 croissance prompts-bourgeons: très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 353 longueur entrenoeuds: très courts (<60mm) 1 - courts (90mm) 3- moyens (120mm) 5 -

longs (150mm) 7 - très longs (>180mm) 9.

Valeur absolue : 100

oiv 354 diamètre entrenoeuds: très petit (<5mm) 1 - petit (8mm) 3 - moyen (11mm) (5 grand (14mm) 7 - très grand (>17mm) 9.

Valeur absolue 101

Porte-greffe

oiv 551 rendement en bois/ha: très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9. oiv 552 formation de cal de soudure : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

oiv 553 aptitude à la rhizogenèse : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

Vassal:

Noeuds: aplatis 1 - movens 2 - saillants 3

Pruine sur sarment : absence 1 - partiellement présente 2 - présente 3.

Formulaire de description 7/8 – début

(sur feuilles d'herbier - collecte entre nouaison et véraison)

Année: 2003 Code cépage: O

Code introduction: 227 Nom introduction: Chasselas U 56 AF

Observateur: TD

Emplacement: 2 R 11 13 3 4 6 - 350

Notations qualitatives*

oiv 076 forme des dents : côtés concaves 1 - côtés rectilignes 2 - mélange notation 2 et 4 : 3 côtés convexes 4 - un côté concave, un côté convexes oiv 077 taille des dents : très petites 1 - petites 3 - moyennes 5 - grandes 7 - très grandes 9. oiv 078 rapport longueur/largeur dents: très courtes 1 - courtes 3 - moyennes 5 - longues 7 - très longues 9.

oiv 079 ouverture sinus pétiolaire : très ouvert 1 - ouvert 22 peu ouvert 3 - fermé 4 lobes chevauchants 5 - lobes très chevauchants 6. oiv 080 forme base sinus pétiolaire : en U 1 - en accolade 2 - en V 3 oiv 081-1 dents sur bord sinus pétiolaire : absence 1 - présence assez fréquente 1 ou 2 dents 2. oiv 081-2 sinus pétiolaire dégarni : absence 1 - présence fréquente sur un côté 2 - présence fréquente sur deux côtés 3.

oiv 082 ouverture sinus latéraux supérieurs : absence sinus 1 - ouvert 2 - fermé 3 lobes chevauchants 4. oiv 083-1 forme base sinus latéraux supérieurs : en U 1 - en accolade 2- en V 3. oiv 083-2 présence dent fond sinus latéraux supérieurs : absence T présence fréquente 2.

Mesures de longueurs

oiv 601 longueur nervure N1: très courte (<75mm) 1 - courte (105mm) 3 - moyenne (135mm) 5 longue (165mm) 7 - très longue (>195mm) 9. oiv 602 longueur nervure N2: très courte (<65mm) 1 - courte (85mm) 3 - moyenne (105mm) 5 -Valeur absolue (en mm): 30 longue (125mm) 7 - très longue (>145mm) 9. oiv 603 longueur nervure N3: très courte (<35mm) 1 - courte (55mm) 3 moyenne (75mm) 5 longue (95mm) 7 - très longue (>115mm) 9. Valeur absolue (en mm): 65 oiv 604 longueur nervure N4: très courte (<15mm) 1 - courte (25mm) 3 - moyenne (35mm) 5 longue (45mm) 🖰 très longue (>55mm) 9. Valeur absolue (en mm): 40 oiv 066-4 longueur nervure N5: très courte (<15mm) 1 - courte (25mm) 3 - moyenne (35mm) 5 longue (45mm) 7 - très longue (>55mm) 9. Valeur absolue (en mm): oiv 611 largeur de la feuille : très étroite (<6cm) 1 - étroite (10cm) (10cm) (14cm) 5 large (18cm) 7 - très large (>22cm) 9. Valeur absolue (en mm):

... / ...

^{*} voir également le formulaire 4/8 « feuille adulte »